

の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳まで
女の子用

ワクチン接種が済んだら
チェックをいれましょう!

ワクチン.net

実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール2020年10月版

生まれ

ワクチン名	接種回数	0歳	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月~11か月	12か月~15か月	16か月~17か月	18か月~23か月	2歳	3歳	
Hib(ヒブ) 定期 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ27~56日(4~8週)あける					④	③-④は7~13か月あける				
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける					④	③-④は60日(2か月)以上あけて、標準として1歳~1歳3か月で接種				
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射	3			①	②	①-②は27日(4週)以上あける			③	①-③は139日(20週)以上あける							
ユニバーサル 母子感染予防		①	②	母親がHBs抗原陽性の場合は接種			③										
ロタウイルス 定期 生 経口	2			①	②	①-②は4週以上あける ②は生後24週0日までに完了する											
	3			①	②	③	①-②-③は4週以上あける ③は生後32週0日までに完了する										
4種混合(DPT-IPV) 定期 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける					④	③-④は6か月以上あけ、標準的には③終了後12~18か月の間に接種				
3種混合(DPT) 定期 不活化 皮下注射	4	CHECK 4種混合を4回又は3種混合とポリオをそれぞれ4回接種する															
2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射	1	11歳に定期接種															
ポリオ(IPV) 定期 不活化 皮下注射	4																
BCG 定期 生 経皮スタンプ	1						①										
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射	2											①	就学前に2回目接種				
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射	2											①		②			
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射	1											①					
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射	4											①-②は6~28日(1~4週)あける③を4歳、④を9歳に接種			①	②	
インフルエンザ 任意 不活化 皮下注射	1-2/年						毎年10,11月など	①	②	①-②は2~4週あける		①	②		①	②	
ヒトパピローマウイルス 定期 不活化 筋注	3															中学1年生(女子)に3回接種	
	3																

定期 定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します(公費、一部負担あり)。

任意 任意接種：希望者が各自で受けます(自己負担、自治体によっては助成金が出る場合もあり)。

不活化 不活化ワクチン

生 生ワクチン

定期接種の推奨期間

任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の接種可能な期間

健康保険での接種可能な期間

の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳まで
男の子用

ワクチン接種が済んだら
チェックをいれましょう!

ワクチン.net

実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール2020年10月版

生まれ

ワクチン名	接種回数	0歳	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月~11か月	12か月~15か月	16か月~17か月	18か月~23か月	2歳	3歳	
Hib(ヒブ) 定期 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ27~56日(4~8週)あける					④	③-④は7~13か月あける				
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける					④	③-④は60日(2か月)以上あけて、標準として1歳~1歳3か月で接種				
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射	ユニバーサル			①	②	①-②は27日(4週)以上あける			③	①-③は139日(20週)以上あける							
	母子感染予防	①	②	母親がHBs抗原陽性の場合は接種			③										
ロタウイルス 定期 生 経口	1価			①	②	①-②は4週以上あける ②は生後24週0日までに完了する											
	5価			①	②	③	①-②-③は4週以上あける ③は生後32週0日までに完了する										
4種混合(DPT-IPV) 定期 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける					④	③-④は6か月以上あけ、標準的には③終了後12~18か月の間に接種				
3種混合(DPT) 定期 不活化 皮下注射	4	CHECK 4種混合を4回又は3種混合とポリオをそれぞれ4回接種する															
2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射	1																
ポリオ(IPV) 定期 不活化 皮下注射	4																
BCG 定期 生 経皮スタンプ	1					①											
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射	2											①	就学前に2回目接種				
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射	2						①-②は3か月以上 標準的には6~12か月あける					①		②			
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射	1											①					
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射	4											①-②は6~28日(1~4週)あける③を4歳、④を9歳に接種			①	②	
インフルエンザ 任意 不活化 皮下注射	1-2/年						毎年10,11月など	①	②	①-②は2~4週あける		①	②		①	②	

MEMO

定期 定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します(公費、一部負担あり)。

任意 任意接種：希望者が各自で受けます(自己負担、自治体によっては助成金が出る場合もあり)。

不活化 不活化ワクチン

生 生ワクチン

定期接種の推奨期間

任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の接種可能な期間

健康保険での接種可能な期間

の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳以降
女の子用

ワクチン接種が済んだら
チェックをいれましょう!

ワクチン.net

実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール2020年10月版

生まれ

ワクチン名	接種回数	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	～	
Hib(ヒブ) 定期 不活化 皮下注射	4	■	■															
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射	4	■	■															
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ユニバーサル 母子感染予防																		
ロタウイルス 定期 生 経口	1価	■	■															
	5価	■	■															
4種混合(DPT-IPV) 定期 不活化 皮下注射	4	7.5歳まで																
3種混合(DPT) 定期 不活化 皮下注射	4	7.5歳まで		追加接種を推奨(任意接種)						2種混合ワクチンの代わりに3種混合ワクチンを接種してもよい(任意接種)								
2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射	1									① <input checked="" type="checkbox"/>	標準的には11歳に接種							
ポリオ(IPV) 定期 不活化 皮下注射	4	7.5歳まで		追加接種を推奨(任意接種)														
BCG 定期 生 経皮スタンプ	1																	
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射	2		就学前1年間															
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射	2																	
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射	1																	
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射	4	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	③ <input checked="" type="checkbox"/>	①-②は6~28日(1~4週)あけ3歳で接種 ③は①から1年あけて4歳で接種						④ <input checked="" type="checkbox"/>	2007年4月2日~2009年10月1日生まれの方は生後6か月~90か月未満と9歳~13歳未満の間に定期接種として1期の接種が可能 1995年4月2日~2007年4月1日生まれの方は20歳未満まで定期接種の対象							
インフルエンザ 任意 不活化 皮下注射	1-2/年	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/>	
ヒトパピローマウイルス 定期 不活化 筋注	2価	毎年10,11月などに接種①-②は2~4週あける										① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/>	①-②は1か月、①-③は6か月あけて接種					
	4価	毎年10,11月などに接種①-②は2~4週あける										中学1年生の間に3回接種			① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/>	①-②は2か月、①-③は6か月あけて接種		

■ 定期 定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します(公費、一部負担あり)。
■ 任意 任意接種：希望者が各自で受けます(自己負担、自治体によっては助成金が出る場合あり)。
■ 不活化 不活化ワクチン
■ 生 生ワクチン
■ 定期接種の推奨期間
■ 任意接種の推奨期間
■ 定期接種の接種可能な期間
■ 任意接種の接種可能な期間



の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳以降
男の子用



ワクチン接種が済んだら
チェックをいれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール2020年10月版

生まれ

ワクチン名	接種回数	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	～
Hib(ヒブ) 定期 不活化 皮下注射	4	■	■														
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射	4	■	■														
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射	ユニバーサル	■	■														
	母子感染予防	■	■														
ロタウイルス 定期 生 経口	1価																
	5価																
4種混合(DPT-IPV) 定期 不活化 皮下注射	4	■	■	■	■	■											
3種混合(DPT) 定期 不活化 皮下注射	4	■	■	■	■	■											
2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射	1									①							
ポリオ(IPV) 定期 不活化 皮下注射	4	■	■	■	■	■											
BCG 定期 生 経皮スタンプ	1																
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射	2																
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射	2																
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射	1																
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射	4	■	■	■	■	■											
インフルエンザ 任意 不活化 皮下注射	1-2/年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

7.5歳まで

7.5歳まで

7.5歳まで

追加接種を推奨
(任意接種)

追加接種を推奨
(任意接種)

①

標準的には11歳に接種

就学前1年間

②

①-②は6~28日(1~4週)あけ3歳で接種
③は①から1年あけて4歳で接種

2007年4月2日~2009年10月1日生まれの方は生後6か月~90か月未満と9歳~13歳未満の間に定期接種として1期の接種が可能

1995年4月2日~2007年4月1日生まれの方は20歳未満まで定期接種の対象

毎年10、11月などに接種 13歳以上は年1回

MEMO

定期 定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します(公費、一部負担あり)。
任意 任意接種：希望者が各自で受けます(自己負担、自治体によっては助成金が出る場合あり)。

不活化 不活化ワクチン
生 生ワクチン

定期接種の推奨期間
任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間
任意接種の接種可能な期間

