



# の予防接種マイルストーン

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳まで  
女の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が  
済んだらチェックを  
いれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2025年5月版

生まれ		0歳	6週	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月~11カ月	12カ月~15カ月	16カ月~17カ月	18カ月~23カ月	2歳	3歳
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射	ユニバーサル 母子感染予防			①	②	①-②は27日(4週)以上あける			③	①-③は139日(20週)以上あける						
	3	①	②	母親がHBs抗原陽性の場合は接種				③								
ロタウイルス 定期 生 経口	1価			①	②	①-②は4週以上あける ②は生後24週0日までに完了する										
	5価			①	②	③	①-②-③は4週以上あける ③は生後32週0日までに完了する									
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける					④	③-④は60日(2カ月)以上あけて、標準として1歳~1歳3カ月で接種			
5種混合(DPT-IPV-Hib) 定期 不活化 皮下注射・筋注	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける					④	③-④は6カ月以上あけ、③終了後6~18カ月の間に接種 ※1歳を超えたら早期接種を推奨			
3種混合(DPT) 任意 不活化 皮下注射	4															
2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射	1															11歳に定期接種
ポリオ(IPV) 任意 不活化 皮下注射	4															
インフルエンザb型(ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ27~56日(4~8週)あける					④	③-④は7~13カ月あける			
4種混合(DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射	4			①	②	③	①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける					④	③-④は6カ月以上あけ、③終了後12~18カ月の間に接種			
BCG 定期 生 経皮スタンプ	1						①									
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射	2											①	就学前に2回目接種			
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射	2							①-②は3カ月以上 標準的には6~12カ月あける				①		②		
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射	1											①				
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射	4				生後6カ月から接種可能							①-②は6~28日(1~4週)あける③を4歳、④を9歳に接種		①	②	
インフルエンザ 任意	1-2 (1年毎)				生後6カ月から接種可能		①	②	毎年10、11月などに接種 ①-②は2~4週あける		①	②		①	②	
新型コロナウイルス 任意	※															
ヒトパピローマウイルス 不活化 筋注	9価 定期	2 または3														中学1年生(女子)に2回接種
	2価・4価 定期接種可能	3														中学1年生(女子)に3回接種

CHECK  
5種混合(4回)  
又は  
4種混合とHib  
(それぞれ4回)

年齢によって使用できる  
製剤が異なるため、  
医師に相談のうえ接種



# の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳まで  
男の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が  
済んだらチェックを  
いれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2025年5月版

生まれ		0歳	6週	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月~11カ月	12カ月~15カ月	16カ月~17カ月	18カ月~23カ月	2歳	3歳
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射	ユニバーサル 母子感染 予防			1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	①-②は27日(4週)以上あける			3 <input checked="" type="checkbox"/>	①-③は139日(20週)以上あける						
		1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	母親がHBs抗原陽性の場合は接種				3 <input checked="" type="checkbox"/>								
ロタウイルス 定期 生 経口	1価			1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	①-②は4週以上あける ②は生後24週0日までに完了する										
	5価			1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	①-②-③は4週以上あける ③は生後32週0日までに完了する									
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射				1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける					4 <input checked="" type="checkbox"/>	③-④は60日(2カ月)以上あけて、標準として1歳~1歳3カ月で接種			
5種混合(DPT-IPV-Hib) 定期 不活化 皮下注射・筋注				1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける					4 <input checked="" type="checkbox"/>	③-④は6カ月以上あけ、③終了後6~18カ月の間に接種 ※1歳を超えたら早期接種を推奨			
3種混合(DPT) 任意 不活化 皮下注射																
2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射																11歳に定期接種
ポリオ(IPV) 任意 不活化 皮下注射																
インフルエンザ菌b型(ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射				1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	①-②-③はそれぞれ27~56日(4~8週)あける					4 <input checked="" type="checkbox"/>	③-④は7~13カ月あける			
4種混合(DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射				1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける					4 <input checked="" type="checkbox"/>	③-④は6カ月以上あけ、③終了後12~18カ月の間に接種			
BCG 定期 生 経皮スタンプ							1 <input checked="" type="checkbox"/>									
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射												1 <input checked="" type="checkbox"/>	就学前に2回目接種			
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射								①-②は3カ月以上 標準的には6~12カ月あける				1 <input checked="" type="checkbox"/>		2 <input checked="" type="checkbox"/>		
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射												1 <input checked="" type="checkbox"/>				
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射					生後6カ月から接種可能							①-②は6~28日(1~4週)あける③を4歳、④を9歳に接種		1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	
インフルエンザ 任意	1-2 (1年毎)				生後6カ月から接種可能		1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	毎年10、11月などに接種 ①-②は2~4週あける		1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>			1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>
新型コロナウイルス 任意	※															

**CHECK**  
5種混合(4回)  
又は  
4種混合とHib  
(それぞれ4回)

年齢によって使用できる  
製剤が異なるため、  
医師に相談のうえ接種

MEMO

---



---



# の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳以降  
女の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が  
済んだらチェックを  
いれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2025年5月版

ワクチン名		接種回数	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	～
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射	ユニバーサル	3																
	母子感染予防																	
ロタウイルス 定期 生 経口	1価	2																
	5価	3																
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射		4																
5種混合(DPT-IPV-Hib) 定期 不活化 皮下注射・筋注		4	7.5歳まで															
3種混合(DPT) 任意 不活化 皮下注射		4																
2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射		1									1							
ポリオ(IPV) 任意 不活化 皮下注射		4																
インフルエンザ菌b型(ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射		4																
4種混合(DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射		4	7.5歳まで															
BCG 定期 生 経皮スタンプ		1																
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射		2																
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射		2																
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射		1																
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射		4	1	2	3					4								
インフルエンザ 任意		1-2 (1年毎)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
新型コロナウイルス 任意	※																	
ヒトパピローマウイルス 不活化 筋注	9価 定期	2 または3																
	2価・4価 定期接種可能	3																

定期 定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します(公費、一部負担あり)。任意 任意接種：希望者が各自で受けます(自己負担、自治体によっては助成金が出る場合あり)。不活化 不活化ワクチン 生 生ワクチン mRNA mRNAワクチン



# の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳以降  
男の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が済んだらチェックをいれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2025年5月版

## 生まれ

ワクチン名	接種回数	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	～	
<b>B型肝炎</b> ユニバーサル 母子感染予防 定期 不活化 皮下注射	3																	
<b>ロタウイルス</b> 1価 定期 生 経口	2																	
<b>5価</b>	3																	
<b>肺炎球菌</b> 定期 不活化 皮下注射	4																	
<b>5種混合 (DPT-IPV-Hib)</b> 定期 不活化 皮下注射・筋注	4	7.5歳まで																
<b>3種混合 (DPT)</b> 任意 不活化 皮下注射	4																	
<b>2種混合 (DT)</b> 定期 不活化 皮下注射	1																	
<b>ポリオ (IPV)</b> 任意 不活化 皮下注射	4																	
<b>インフルエンザ菌b型 (ヒブ)</b> ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射	4																	
<b>4種混合 (DPT-IPV)</b> ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射	4	7.5歳まで																
<b>BCG</b> 定期 生 経皮スタンプ	1																	
<b>MR (麻しん風しん混合)</b> 定期 生 皮下注射	2																	
<b>水痘 (みずぼうそう)</b> 定期 生 皮下注射	2																	
<b>おたふくかぜ</b> 任意 生 皮下注射	1																	
<b>日本脳炎</b> 定期 不活化 皮下注射	4																	
<b>インフルエンザ</b> 任意	1-2 (1年毎)																	
<b>新型コロナウイルス</b> 任意	※																	

MEMO